

Hiina taimravi soodustab diabeetiliste haavandite paranemist

Ravimtaimeretsept soodustab diabeetilise jala haavandite paranemist ja aitab vältida amputatsioone.

Hongkongis viidi läbi randomiseeritud platseebokontrolliga uuring, milles osales 80 diabeetilise haavandiga haiget. Kõik haiged said standardravi (adekvaatne diabeedi kontroll, antibiootikumid ja igapäevane haavandi sidumine), millele lisati 4 nädala jooksul kaks korda päevas taimravi preparaati või platseebo jook.

Taimravis kasutati 12 ravimtaime k.a *Huang Qi* (Astragali Radix), *Sheng Di Huang* (Rehmanniae Radix) ja *Bai Zhu* (Atractylodis macrocephalae Rhizoma) dekoktist (keedusest) valmistatud graanuleid

4 nädalat kestnud ravi järgselt oli 18 haige paranemine ebarahuldav - haavand oli jäänud nekrootiliseks. Nendest 18 haigest 12 kuulus platseebogruppi, 6 taimravi gruppi. Seejärel anti neile kõigile 18 haigele taimravi preparaati. Nendest 18 st haigest 6 seisund halvenes jätkuvalt, mistõttu tehti neile jala amputatsioon. Kõik amputatsiooni vajanud haiged tulid platseebogrupist, kuid need 12 haiget, kes "päästeti" amputatsioonist, tulid võrdselt esmasest taimravi ja platseebogruppidest.

Proinflammatoorse tsütokiniini TNF-alfa tase vähenes ravikuuri ajal mõlemas grupis, kuid taimravi grupis oli langus suurem.

Foot (Edinb). 2012 Mar 29. [Epub ahead of print].